Exploration de la biodiversité des champignons filamenteux

Applications dans le domaine des biotechnologies

Lesage-Meessen Laurence, Jean-Guy Berrin, Anne Favel, Anne Lomascolo,
Craig Faulds

Colloque Les champignons
3-4 juin 2015

Présentation

UMR1163 Biodiversité et Biotechnologie
Fongiques,
INRA/AMU, Polytech-Marseille Luminy
dirigée par le Professeur Craig Faulds
Thématiques de l'UMR: *Etudes de la biodiversité
fongique au plan taxonomique, enzymatique et
génomique pour des applications dans le domaine de
la chimie verte*

Laurence Lesage-Meessen
Chercheur INRA,
Biotechnologie des Champignons Filamenteux
lignocellulolytiques

UMR BBF 1163

UMR1163 Biodiversité et Biotechnologique Fongiques

- Collection **CIRM-CF** de champignons filamenteux d'intérêt agro-industriel hébergée par l'unité
- **Exploration de la biodiversité des champignons filamenteux** pour des applications dans le domaine des biotechnologies
 - I. Approche globale : Exploration de la biodiversité enzymatique fongique naturelle pour la production de bioéthanol 2G
 - II. Approche ciblée sur un genre : Exploration de la biodiversité du genre *Pycnoporus* par analyse phylogénétique et recherche de nouvelles enzymes d'intérêt (eg laccases)
 - III. Approche ciblée sur un groupe : Exploration de la diversité enzymatique du groupe *Aspergillus niger* aggregate : relation phylogénie / fonction enzymatique (eg activité estérase)

Le CIRM : Centre International de Ressources Microbiennes de l'INRA

- Le CIRM est un réseau de cinq collections INRA dédiées à la **conservation** et à l'**exploration** de la diversité microbienne (15 000 souches de bactéries, levures et champignons filamenteux). Le CIRM répond à la certification ISO 9001, est labellisé CRB IBiSA et reconnu Plateforme Stratégique Nationale par la CNOC (<https://www6.inra.fr/cirm/>).
- Le CIRM est distribué sur 5 sites sur des thématiques différentes.

- Bactéries d'intérêt alimentaire (**CIRM-BIA Rennes**)
- Bactéries pathogènes de l'animal et de l'homme (**CIRM-BP Tours**)
- Bactéries associées aux plantes (**CIRM-CFBP Angers**)
- Levures d'intérêt technologique (**CIRM-levures Thivernal-Grignon**)
- Champignons filamenteux d'intérêt agro-industriel (**CIRM-CF Marseille**)

CIRM-Champignons Filamenteux (CIRM-CF) (1)

- ❑ **Collection jeune** (2006) née du regroupement de collections (INRA, MNHN, CIRAD, Université Paris Descartes, Université Joseph Fourier de Grenoble...)
- ❑ **1685 souches fongiques** (*living cultures*)
 - 75 % de Basidiomycètes (Polyporales) et 25 % d'Ascomycètes
 - 335 genres ; 501 espèces
- ❑ **Conservation** selon des hauts standard de qualité et **authentification** au niveau moléculaire (ITS)

- ❑ **Collection attractive par sa spécialisation** (champignons dégradant le bois), son **enrichissement** par des collectes effectuées sur le territoire français, en métropole, mais aussi en Guyane, Guadeloupe, Martinique et Nouvelle-Calédonie.

CIRM-CF: Enrichissement par des collectes de terrain (2)

Ex: Collectes en Guyane Française (2007 - 2010) (4 missions, 37 sorties sur le terrain)

- 968 spécimens collectés (65 % Polyporales; 35 % ascomycètes)
- 360 cultures positives monomorphes
- 223 pures et authentifiées au niveau moléculaire (ITS)

Une grande diversité géographique

Le CIRM-CF: Riche en données associées et objet de valorisation (3)

□ Bases de données associées

- **BRFM database** ([https://www6.inra.fr/cirm/Champignons-Filamenteux:Catalogue des CIRM](https://www6.inra.fr/cirm/Champignons-Filamenteux:Catalogue%20des%20CIRM))

- **Fungene.db** : outil bioinformatique d'aide à l'identification des souches

* Constitution d'une base de séquences ITS fiable, adossée à une classification récente et consensuelle (Ainsworth & Bisby's Dictionary of the Fungi, 10ème Edition)

* Identification de séquences type par espèce (contrôle de l'identité d'une souche, aide à l'identification)

* Intégration des outils bioinformatiques classiques pour une analyse phylogénétique (pour souche inconnue)

➡ Service web fiable et évolutif dédié à l'analyse moléculaire des Polyporales (au 18/05/15: 4799 séquences ITS contrôlées/3622 acceptées, représentant 141 genres 598 espèces) : Navarro et al (2012) *J Biotechnol*, 161:383- (<http://fungene-db.fr/>)

□ **Valorisation** de la collection dans le domaine des biotechnologies avec pour cible **la biomasse lignocellulosique**

Le CIRM-CF: source de Champignons Filamenteux riches en enzymes ligno-cellulolytiques (4)

**Biomasse
Lignocellulosique**

Lignine (15-25 %)

Hémicellulose
(23-32 %)

Cellulose
(38-50 %)

Le CIRM-CF: source de Champignons Filamenteux riches en enzymes ligno-cellulolytiques (4)

**Biomasse
Lignocellulosique**

Lignine (15-25 %)

Enzymes
lignolytiques
(Auxiliary Activities
dans CAZymes)

Hémicellulose
(23-32 %)

Cellulases et
Hémicellulases
(CAZymes)

Cellulose
(38-50 %)

Basidiomycètes

"White-rot fungi"

"Brown-rot fungi"

(Polyporales)

Pycnoporus sp.

"Soft-rot fungi"

Ascomycètes

Trichoderma reesei

Aspergillus niger Tiegh

- Collection **CIRM-CF** de champignons filamenteux d'intérêt agro-industriel hébergée par l'unité
- **Exploration de la biodiversité des champignons filamenteux** pour des applications dans le domaine des biotechnologies
 - I. Approche globale : Exploration de la biodiversité enzymatique fongique naturelle pour la production de bioéthanol 2G
 - II. Approche ciblée sur un genre : Exploration de la biodiversité du genre *Pycnoporus* par analyse phylogénétique et recherche de nouvelles enzymes d'intérêt (eg laccases)
 - III. Approche ciblée sur un groupe : Exploration de la diversité enzymatique du groupe *Aspergillus niger* aggregate : relation phylogénie / fonction enzymatique (eg activité estérase)

I. Exploration de la biodiversité enzymatique fongique pour la production de bioéthanol 2G (1)

I. Exploration de la biodiversité fongique du CIRM-CF collectée en milieux naturels, tropicaux et tempérés (2)

Collecte de la biodiversité naturelle

74 souches isolées de spécimens fraîchement collectés, authentifiées et conservées au CIRM-CF (cladogramme construit sur base de séquences ITS)

I. Exploration de la biodiversité enzymatique fongique : stratégie d'étude (3)

Trichoderma reesei
(modèle industriel producteur de cellulases)

Biodiversité naturelle du CIRM-CF

+

Paille de blé

Saccharification

Sucres fermentescibles

I. Exploration de la biodiversité enzymatique fongique : cultures et test de saccharification haut-débit (4)

- Microcultures en condition d'induction (son de céréale)

- Criblage au robot des sécrétomes : test de saccharification par dosage des sucres totaux

Sélection de 19 sécrétomes

(Navarro et al, 2010. Microb Cell Fact 9:58)

I. Exploration de la biodiversité enzymatique fongique : distribution des espèces selon leur capacité d'hydrolyse (5)

Secrétomes
(seuls)

- Secrétomes commerciaux
- Secrétomes de champignons collectés en régions tropicales
- △ Secrétomes de champignons collectés en régions tempérées

Secrétomes +
cocktail *T. reesei*

➤ Caractérisation enzymatique des secrétomes

Berrin et al, 2012. *Appl Environ Microbiol*, 78:6483

- Collection **CIRM-CF** de champignons filamenteux d'intérêt agro-industriel hébergée par l'unité
- **Exploration de la biodiversité des champignons filamenteux** pour des applications dans le domaine des biotechnologies
 - I. Approche globale : Exploration de la biodiversité enzymatique fongique naturelle pour la production de bioéthanol 2G
 - II. Approche ciblée sur un genre : Exploration de la biodiversité du genre *Pycnoporus* par analyse phylogénétique et recherche de nouvelles enzymes d'intérêt (eg laccases)
 - III. Approche ciblée sur un groupe : Exploration de la diversité enzymatique du groupe *Aspergillus niger* aggregate : relation phylogénie / fonction enzymatique (eg activité estérase)

II. Exploration de la biodiversité du genre *Pycnoporus* (1)

- Champignon saprophyte de la pourriture blanche du bois (homobasidiomycète, Polyporales, Polyporaceae) au basidiocarpe orangé
- Quatre espèces définies sur la base de caractéristiques morphologiques (taille des pores des basidiocarpes, forme des basidiospores) et de leur origine géographique

Pycnoporus cinnabarinus
(Jacq.) P. Karst

Hémisphère
nord

Pycnoporus sanguineus
(L.) Murrill

Régions
tropicales et
sub-tropicales

Pycnoporus coccineus
(Fr.) Bondartsev & Singer

Pays proches de
l'Inde et bordant
l'océan pacifique

Pycnoporus puniceus
(Fr.) Ryvarden

Espèce rare trouvée en
Afrique, Inde, Malaisie,
Nouvelle-Calédonie,
Nouvelle-Zélande

II. Exploration du genre *Pycnoporus*, producteur de laccase (2)

- Laccase, oxydoréductase (EC 1.10.3.2) à cuivre, impliquée dans la dégradation du bois
- Capable d'oxyder des constituants de la matière organique naturelle (polyphénols, phénols méthoxy-substitués) et antropique (colorants industriels, composés aromatiques polycycliques)

Laccase
(*p*-diphénol:oxygène oxydoréductase)

Haut potentiel comme bio-agents dans les biotechnologies blanches et vertes

Biofuels

Décoloration du textile

Blanchiment
pâte à papier

Bioplastiques

II. Exploration du genre *Pycnoporus* : souches d'origine très diversifiée (3)

Etude de la Biodiversité naturelle
du genre *Pycnoporus* au sein du
CIRM-CF

II. Exploration du genre *Pycnoporus* : souches d'origine très diversifiée (3)

Etude de la Biodiversité naturelle du genre *Pycnoporus* au sein du CIRM-CF

- Criblage de l'activité laccase avec acide férulique comme inducteur à la recherche de laccases aux propriétés innovantes (eg souches tropicales)
- Analyse phylogénétique au sein des quatre espèces du genre sur la base des séquences ITS et d'une région du gène codant pour la laccase (*Lac 1*)

II. Exploration du genre *Pycnoporus* : à la recherche de nouvelles laccases (4)

ABTS comme substrat

(2,2'-azino-bis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid))

II. Exploration du genre *Pycnoporus* : à la recherche de nouvelles laccases (4)

ABTS comme substrat
(2,2'-azino-bis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid))

Arbre ITS

T. suaveolens CBS 446.61 - Austria

- P. sanguineus* CIRM-BRFM 906 - French Guiana
- P. sanguineus* CIRM-BRFM 893 - French Guiana
- P. sanguineus* CIRM-BRFM 902 - French Guiana
- P. sanguineus* CIRM-BRFM 881 - Venezuela
- P. sanguineus* CIRM-BRFM 901 - French Guiana
- P. sanguineus* CIRM-BRFM 892 - French Guiana
- P. sanguineus* CIRM-BRFM 900 - French Guiana
- P. sanguineus* CIRM-BRFM 905 - French Guiana
- P. sanguineus* CIRM-BRFM 899 - French Guiana
- P. sanguineus* CIRM-BRFM 903 - French Guiana
- P. sanguineus* CIRM-BRFM 896 - French Guiana
- P. sanguineus* CIRM-BRFM 895 - French Guiana
- P. sanguineus* MUCL 29375 - Madagascar
- P. sanguineus* CIRM-BRFM 980 - New Caledonia
- P. sanguineus* CIRM-BRFM 981 - New Caledonia
- P. sanguineus* CIRM-BRFM 942 - Vietnam
- P. sanguineus* CIRM-BRFM 943 - Vietnam
- P. sanguineus* CIRM-BRFM 979 - New Caledonia
- P. coccineus* CBS355.63 - Solomon Islands
- P. sanguineus* IMB H2180 - China
- P. sanguineus* IMB G53 - China
- P. coccineus* MUCL 38527 - Japan
- P. sanguineus* IMB G05.10 - China (MK)
- P. sanguineus* CIRM-BRFM 542 - Unknown
- P. sanguineus* IMB W006-2 - China
- P. sanguineus* IMB G66 - China
- P. sanguineus* IMB W3008 - China
- P. coccineus* MUCL 38523 - Australia
- [*P. cinnabarinus*] MUCL 38420 - Australia
- P. coccineus* MUCL 38525 - Australia

Laccase activity (nkat/ml)

0 200 400 600 800

Nouvelles laccases de *Pycnoporus*

- Purification
- Caractérisation

Nouvelles propriétés biotechnologiques

- Haute thermostabilité
- Haut potentiel redox (0,73-0,75 V à pH 6)
- Forte stabilité au pH (3-7)
- Résistance aux solvants alcooliques
- Dégradation des colorants polyphénoliques

Uzan et al (2010) J. Appl Microbiol 108: 2199
Uzan et al (2011) Appl Microbiol Biotechnol 90:97

II. Analyse phylogénétique du genre *Pycnoporus* sur la base des séquences *lac1*: diversité fonctionnelle (5)

- Collection **CIRM-CF** de champignons filamenteux d'intérêt agro-industriel hébergée par l'unité
- **Exploration de la biodiversité des champignons filamenteux** pour des applications dans le domaine des biotechnologies
 - I. Approche globale : Exploration de la biodiversité enzymatique fongique naturelle pour la production de bioéthanol 2G
 - II. Approche ciblée sur un genre : Exploration de la biodiversité du genre *Pycnoporus* par analyse phylogénétique et recherche de nouvelles enzymes d'intérêt (eg laccases)
 - III. Approche ciblée sur un groupe : Exploration de la diversité enzymatique du groupe *Aspergillus niger* aggregate : relation phylogénie / fonction enzymatique (eg activité estérase)

III. Analyse phylogénétique du groupe des *Aspergillus niger* aggregate et activité féruloylestérase (1)

Aspergillus niger

Eurotiales, Trichocomaceae

- *Aspergillus awamori* Nakaz.
- *Aspergillus foetidus* Thom & Raper
- *Aspergillus niger* Tiegh.
- *Aspergillus tubingensis* Mosseray

III. Analyse phylogénétique du groupe des *Aspergillus niger* aggregate et activité féruloylestérase (1)

Aspergillus niger

Eurotiales, Trichocomaceae

- *Aspergillus awamori* Nakaz.
- *Aspergillus foetidus* Thom & Raper
- *Aspergillus niger* Tiegh.
- *Aspergillus tubingensis* Mosseray

Enzyme ciblée **Féruloylestérase** (carboxylic ester hydrolase EC 3.1.1.73)

Marmuse et al, 2008, *Org Biomol Chem*, 6:1208.
Benoit et al, 2007, *Appl Microbiol Biotechnol*, 73: 5624
Bouزيد et al, 2006, *Can J Microbiol*, 52:886

2 types d'activité

* **Sinapic methyl ester (FAEA)**

* **p-Coumaric methyl ester (FAEB)**

Phylogénie:

- Région ITS (ITS1-5.8S rRNA gene-ITS2)
- Séquences codant pour la β -tubuline (Bt2a/Bt2b)

III. Relation phylogénie/fonction féruloylestérase chez *Aspergillus niger* aggregate (2)

➤ Production espèce-dépendante des féruloylestérases: « Molecular clustering » type A et type B: phylogénie prédictive

Conclusions

- ✓ Collection CIRM-CF jeune, mais attractive au niveau académique et industriel par sa spécialisation et sa diversité
- ✓ Richesse naturelle donnant accès à une diversité d'enzymes lignocellulolytiques d'origine eucaryote encore mal connues
- ✓ Transfert de connaissances au travers de bases de données
- ✓ Approche originale de l'étude des fonctions enzymatiques au travers de la phylogénie de groupes d'intérêt
- ✓ Aujourd'hui, approche intégrée (plus ambitieuse) d'exploration de la biodiversité au niveau des génomes, transcriptome et sécrétomes (séquençage du génome de 40 champignons Polyporales du CIRM-CF via DOE JGI (US Department of Energy))

Merci aux partenaires premium

QR